

دریچه

بخش‌نامه انتقال خون ایران برای جلوگیری ازانتقال «کرونا»

● شرق: سازمان انتقال خون ایران با ارسال بخش‌نامه فوری به ادارات کل انتقال خون سراسر کشور، توصیه‌های لازم را برای حفظ سلامت نیروی انسانی و سلامت خون‌های اهدایی به آنها ابلاغ کرد.
معاونت‌های فنی و فناوری‌های نوین و کنترل کیفی و تضمین کیفیت سازمان انتقال خون، با ارسال بخش‌نامه‌ای به مراکز انتقال خون سراسر کشور از آنان خواستند ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حفظ سلامت نیروی انسانی و سلامت خون و فرآورده‌ها، اقدامات پیشگیرانه را برای ممانعت از انتشار بیماری تنفسی ناشی از کرونا- ویروس «مرس»- مد نظر قرار دهد.
برابر بخش‌نامه یادشده مدت معافیت موقت حجاج محترم از اهدای خون، ۲۸ روز پس از مراجعت و مدت معافیت موقت کسانی که در دو هفته اول پس از مراجعت زائران با آنها ملاقات داشته‌اند، ۲۱ روز اعلام شده است.
بنابر بخش‌نامه روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، معافیت از اهدای خون افرادی که به این ویروس ابتلای قطعی یافته‌اند، ۹۰ روز پس از بهبودی کامل است.

۲۰۰هزار کودک درانتظار دریافت سبد غذایی

● ایسنا: رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به برنامه حمایت تغذیه‌ای از کودکانی که به‌علت فقر، دچار سوءتغذیه هستند، اشاره کرد و درعین‌حال از انتظار ۲۰۰ هزار کودک برای دریافت سبد غذایی به علت تأمین‌نشدن منابع مالی خبر داد.
دکتر زهرا عبداللهی، درباره برنامه حمایت تغذیه‌ای کودکان نیازمند و مبتلا به سوءتغذیه، گفت: یکی از برنامه‌های دفتر بهبود تغذیه جامعه، برنامه کشوری بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر پنج سال است. در قالب این برنامه که از طریق شبکه‌های بهداشتی- درمانی کشور اجرا می‌شود، کودکانی که تحت پوشش شبکه بهداشتی- درمانی کشور هستند با مراجعه به واحدهای بهداشتی- درمانی در شهرها از خدمات و مراقبت‌های تغذیه‌ای در قالب برنامه سلامت کودکان بهره‌مند می‌شوند. وی افزود: در کنار آن خدمات، پایش رشد نیز انجام می‌شود و همه کودکان کارت رشد می‌گیرند که یک نسخه در واحد بهداشتی- درمانی است و یک نسخه در اختیار مادر قرار می‌گیرد. براساس یک برنامه منظم مراقبتی، مادر کودک را به مراکز بهداشتی- درمانی آورده و قد و وزن آنها اندازه گرفته می‌شود و با منحنی‌های استاندارد انطباق داده می‌شود. اگر کودک دچار اختلال در رشد باشد به‌سرعت می‌توان وی را شناسایی کرد و کارهای لازم را انجام داد.
عبداللهی ادامه داد: برخی از این اقدامات درباره تغذیه کودک شاید مربوط به ضعف آگاهی‌های مادر باشد که در این صورت به او مشاوره داده می‌شود، یا اینکه ممکن است این کودکان به‌دلیل فقر و نیازمندی خانوار دچار سوءتغذیه باشند.
بنابراین براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، اگر مشخص شود سوءتغذیه و اختلال رشد کودک زیر پنج سال به علت نیازمندی و فقر خانواده است، لیستی توسط مرکز بهداشت استان تهیه و به کمیته امداد ارسال می‌شود. کمیته امداد نیز آنها را زیر پوشش تغذیه‌ای قرار می‌دهد و سبد غذایی رایگان در اختیار خانواده قرار داده می‌شود.
ترکیب آن را نیز کارشناسان تغذیه در معاونت بهداشت مشخص می‌کنند.

ضوابط آب‌های بسته‌بندی شده بازنگزی شد

● آتا: مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از بازنگزی و ابلاغ ضوابط آب‌های بسته‌بندی شده به معاونان غذا و دارو و دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد.
دکتر هدایت‌الله حسینی گفت: ضوابط آب‌های معدنی آشامیدنی پس از بازنگزی به معاونان غذا و دارو و دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. وی تأکید کرد: این ضوابط که در کمیته فنی و قانونی سازمان غذا و دارو تصویب شد از یکم فرودین ماه امسال تا سال ۹۵ لازم‌الاجراست.
مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه تصریح کرد: این بازنگزی در ارتباط با فاصله مجاز و حفظ حریم تا منابع آلاینده و برخی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی آب‌های آشامیدنی و معدنی بوده است. حسینی در پایان تأکید کرد: پیرو این دستورالعمل معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور موظف به اطلاع‌رسانی لازم، به واحدهای تولیدی آب‌های بسته‌بندی‌شده برای انجام اقدامات لازم هستند.

جشن خیریه یآوری سبز برگزار می‌شود

● شرق: مؤسسه نیکوکاری یآوری سبز هم‌زمان با بازگشایی مدارس، برای حمایت مالی از کودکان بدسرپرست تحت پوشش، جشنواره خیریه برگزار می‌کند. در این جشن با حضور چهره‌های هنری و ورزشی کشور، کمک‌های مالی نیکوکاران برای تأمین هزینه تحصیل کودکان و نوجوانان تحت پوشش جمع‌آوری می‌شود.
جشن خیریه یآوری سبز روز جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ در تهران به آدرس: اتوبان ستاری جنوب به شمال، بعد از تقاطع بلوار فردوس شرق، جنب پل عابریاده، سالن اجتماعات و همایش‌های امام‌علی (ع) برگزار می‌شود.

شهرزاد همتی: بیماری‌های گرمسیری و عفونی جزء نگرانی‌های همیشگی مسئولان وزارت بهداشت ایران است.
بیماری‌هایی که عامل انتقال آن به کشور همسایگی با کشورهای گرمسیر، جنگ‌زده و مهاجرخیز و زیارتی است. هر ساله و پس از مراسم حج واجب، این نگرانی‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند و مسئولان دولتی هشدارهای جدی را برای جلوگیری از انتقال این بیماری‌ها می‌دهند.
یک روز نوبت آتفلوئازهای متفاوت است و روز دیگر نوبت به بیماری‌های عفونی مثل ابولا می‌رسد، امسال اما نوبت کروناست.

کرونا چیست؟

ویروس «کرونا»، به‌عنوان عامل این بیماری به سیستم تنفسی حمله می‌کند و به‌تدریج این سیستم را از کار می‌اندازد و از علایم این بیماری می‌توان به سرفه و تب شدید که به التهاب ریه و نارسایی کلیه منجر می‌شود، اشاره کرد، اما تاکنون واکسنی برای جلوگیری از ابتلا به آن ساخته نشده است.
ویروس‌های کرونا، ویروس‌هایی هستند که اکثر افراد در طول زندگی‌شان به آن مبتلا می‌شوند. ویروس‌های انسانی کرونا معمولاً منجر به بیماری‌های خفیف تا نیمه‌شدید شبکه تنفسی فوقانی می‌شوند. اما آن چیزی که ما از آن صحبت می‌کنیم یک سرماخوردگی ساده نیست. بحث ما درباره گونه شدید کرونا یا «مرس» است.
علایم معمول بیماری در مراحل اولیه شامل تنگی نفس و مشکلات تنفسی جدی است. تب، سرفه و مشکلات گوارشی مانند اسهال نیز در این بیماران دیده می‌شود. هم‌زمان با پیشرفت بیماری، نارسایی کلیه نیز دیده می‌شود و عفونت در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند، منجر به فوت می‌شود.

کرونا درمان قطعی ندارد

دکتر محمدمهدی گويا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «شرق» احتمال ابتلای حجاج بیت‌الله‌الحرام را به ویروس کرنا زیاد می‌داند. وی دراین‌باره می‌گوید: «احتمال اینکه حجاج با خودشان این ویروس را منتقل کرده باشند، وجود دارد. برای همین ما پیشگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. اما این پیشگیری‌ها به معنای قرنطینه حجاج نیست. ما به همه حجاج در عربستان آموزش داده‌ایم و توصیه‌های لازم نیز به آنها شده است».

یکی از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای



بررسی میزان احتمال شیوع بیماری کرونا در کشور باورود حجاج

کرونا سوغاتی جدید از عربستان

پیشگیری از ابتلا به مرس (کرونا)، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

محمدمهدی گويا در ادامه افزود: «ما به حجاج توصیه کرده‌ایم که تا ۱۴ روز پس از ورود به کشور، از تماس مستقیم با افراد جلوگیری کرد. مراسم خود را عقب بیندازند تا ناچار به دیده‌بوسی با افراد مختلف نشوند». وی همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود مشکلات زیادی که امسال در حج برای حاجیان پیش آمده، چقدر این بررسی‌های پزشکی لازم است، خاطرنشان کرد: «ما قدار نیست هیچ‌کس را در قرنطینه نگهداری کنیم. این افراد پیش از ورود به هواپیما آموزش داده شده‌اند و همچنین ما در ۱۹ فرودگاه کشور مأموران خود را مستقر کرده‌ایم تا حاجیان در صورت احساس موارد مشکوک به

جامعه



رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت

بهرتر است از روبوسی‌کردن با افراد خودداری کنیم و به خاطر داشته باشیم این یک اصل بهداشتی مهم است. مسئله اصلی این است که از دیده‌بوسی با حجاج خودداری شود». وی تأکید می‌کند: «نکته بسیار مهم و واجب دیگر شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون است. حجاج باید به‌طور مداوم هر جا آب و صابون دیدند، دست‌های خود را بشویند زیرا ثابت شده شست‌وشوی دست باعث قطع زنجیره انتقال ویروس به دیگران می‌شود». وی در پاسخ به این سؤال که آیا کمسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی راهکاری را برای جلوگیری از شیوع این بیماری در نظر دارد، می‌افزاید: «خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خبری مبنی بر شیوع این بیماری در کشور گزارش نشده و البته بررسی این مسائل برعهده وزارت بهداشت است».

دوشنبه نیز وزیر بهداشت درباره خطر شیوع این بیماری در کشور اظهار کرد: «کشورهایی که حجاج به عربستان اعزام کرده‌اند، باید مراقبت‌هایی را طبق مقررات سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص رعایت کنند. ایران نیز این مراقبت‌ها را از طریق مدیران کاروان‌ها، تیم‌های پزشکی سازمان حج و زیارت و تیم‌های بهداشتی وزارت بهداشت در مبادی ورودی حجاج و نقاط مرزی اجرا می‌کند».

درصورتی‌که فردی به این بیماری مبتلا شد، بهترین راه این است که وظیفه مراقبت از بیمار در منزل تنها به یک نفر سپرده شود و بقیه اطرافیان درصورت امکان از رفت‌وآمد به اتاق بیمار خودداری یا فاصله حداقل یک متر را هنگام تماس با بیمار رعایت کنند. فردی که مراقبت از بیمار را به‌عهده دارد، نباید جزء گروه افراد پرخطر باشد.

شست‌وشوی دست‌ها به‌خصوص قبل از تماس با بیمار و بعد از تماس با او، اجباری بوده و اهمیت بسیاری در جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران دارد. پزشکان مؤکدا توصیه می‌کنند درصورت ابتلا به نشانه‌های این بیماری، از خوددرمانی اکیدا پرهیز و به پزشک یا نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه شود. همچنین این افراد باید اعلام کنند که از سفر حج بازگشته‌اند. این بیماری در افراد حاضر واکسن ندارد.
دروپبی نیز در دنیا برای درمان آن در دسترس نیست. علاوه بر این بهترین راه پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، رعایت نکات بهداشتی و خودمراقبتی است.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

محمدمهدی گويا در ادامه افزود: «ما به حجاج توصیه کرده‌ایم که تا ۱۴ روز پس از ورود به کشور، از تماس مستقیم با افراد جلوگیری کرد. مراسم خود را عقب بیندازند تا ناچار به دیده‌بوسی با افراد مختلف نشوند». وی همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود مشکلات زیادی که امسال در حج برای حاجیان پیش آمده، چقدر این بررسی‌های پزشکی لازم است، خاطرنشان کرد: «ما قدار نیست هیچ‌کس را در قرنطینه نگهداری کنیم. این افراد پیش از ورود به هواپیما آموزش داده شده‌اند و همچنین ما در ۱۹ فرودگاه کشور مأموران خود را مستقر کرده‌ایم تا حاجیان در صورت احساس موارد مشکوک به

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

خبر

اعلام نام ۴ منطقه برحریق تهران

● شرق: رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: چهار منطقه ۱۱، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ پرخطرترین مناطق شهر تهران هستند. معصومه آباد، در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه ۸۱ درصد حریق‌ها در ساختمان‌های پنج‌طبقه به پایین رخ می‌دهد، گفت: متأسفانه در هنگام پایان کار از این‌گونه ساختمان‌ها هیچ استعلامی گرفته نمی‌شود. وی ادامه داد: با توجه به سهم ۸۱ درصدی ساختمان‌های زیر پنج‌طبقه در بروز حوادث و حریق، درخواست می‌شود آتش‌نشانی در استعلامات ایمنی خود این نوع ساختمان‌ها را نیز لحاظ کند.
آباد با اشاره به بازدید سازمان آتش‌نشانی از ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را رعایت نکرده‌اند، گفت: از خطارهایی که به این ساختمان‌ها داده می‌شود، رونوشتی نیز به قوه قضائیه و دادستانی ارسال می‌شود و به دلیل رعایت‌نکردن شاخص‌های ایمنی، این ساختمان‌ها لمبم می‌شود، اما اخیرا قوه قضائیه اعلام کرده نامه آتش‌نشانی ضمانت اجرایی برای این کار نیست و تنها به کار قوه قضائیه اضافه شده است.

افزایش تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی تا پایان سال

● تسنیم: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی از افزایش تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی به ۱۲۷ ایستگاه تا پایان سال جاری خبر داد.
سعید شریف‌زاده در مراسم روز آتش‌نشانی و افتتاح هم‌زمان ۳ ایستگاه آتش‌نشانی، اظهار کرد: در راستای اجرای راهبرد هفتم شهردار تهران مبنی بر تمرکز بر کیفیت ارائه خدمات، امروز باوجود جذب ۶۴ درصد از محل دو درصد عوارض ایمنی ساختمان که برای توسعه ایستگاه‌ها و تجهیزات آتش‌نشانی صورت می‌پذیرد، با افتتاح شش ایستگاه آتش‌نشانی و افزایش ۱۸ ایستگاه، موفق به کاهش متوسط یک کیلومتر از سطح پوشش هر ایستگاه شده‌ایم که منجر به تسریع دسترسی به محل حریق و حوادث می‌شود. وی افزود: با افتتاح ۲۳ روز یک ایستگاه و افزایش ۱۰۳ ایستگاه به ۱۲۱ ایستگاه برای پوشش مناسب و متناسب خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی، تلاش کرده‌ایم و امیدواریم با توجه به تدابیر شهردار تهران، طبق برنامه زمان‌بندی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۱ به افتتاح ۱۲۷ ایستگاه آتش‌نشانی دست یابیم.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: در همین راستا به رشد و توسعه ناوگان خودرویی و تجهیزاتی نیز با افزایش ۲۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی حریق، نجات و پشتیبانی پرداخته شده است. در این مسیر و برای افزایش میزان تناسب بین ایستگاه، نیروی انسانی، ناوگان خودرویی و تجهیزاتی، به جذب و گزینش حدود ۶۰۰ نفر به عنوان نیروی انسانی پرداخته‌ایم. شریف‌زاده افزود: همچنین ۱۲۵ دستگاه تویوتا، ۱۱ دستگاه خودرو کاپرا، سه دستگاه جرقبیل هشت تنی، ۱۰ دستگاه ل‌آف مخصوص حمل تجهیزات عملیاتی، ۱۵ دستگاه سه‌پایه چاه، ۲۰ دستگاه دوربین ارتباطی چاه و… برای سازمان آتش‌نشانی تدارک دیده شده است. شریف‌زاده ادامه داد: در راستای راهبردهای ۷ و ۹ شهردار، مبنی بر تمرکز و کیفیت ارائه خدمات و تقویت و اصلاحات نظامات قانونی، فعالیت‌های مدیریت شهری با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارآمدی در دستور کار قرار گرفته است.

بیان مطالبات زنان در حوزه سلامت به وزیر بهداشت

● ایسنا: معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گفت: ۲۱ مهرماه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با وزیر بهداشت در وزارت بهداشت دیدار می‌کند.
اطهره نژادی، با اعلام این‌ خبر اظهارکرد: در این نشست که با حضور مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، درباره اقدامات وزارت بهداشت از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حوزه زنان بحث و مطالبات زنان در حوزه سلامت بیان می‌شود.
پیگیری ارتقای سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان کارتن‌خواب، زیر پوشش قراردادن ۱۱ هزار زن باردار و شیرده از طریق تهیه و توزیع مکمل‌های مورد نیاز و توان‌افزایی ۳۷هزارو ۵۰۰ نفر از زنان و مردان در آستانه ازدواج برای دستیابی به خانواده سالم و پایدار ازجمله همکاری‌های معاونت امور زنان و زنان بهداشت در دولت یازدهم بوده است.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

چرخش زنانه روی یک لایحه زنانه



نوعی توهین به زنان قلمداد کرد و گفت: این کلمه به این معنی است یک عده افرادی که می‌فهمند، می‌خواهند افرادی که نمی‌فهمند را سازماندهی کنند؛ او در ادامه خواستار حذف یا اصلاح این کلمه شد و با کل لایحه موافق بود.

البته اعضای دیگر مانند مجتبی شاکری یا علیرضا دبیر به‌عنوان مخالفان و پیشنهاددهندگان درباره لایحه هم صحبت کردند. این همه مواردی مانند مشخص نبودن مجری لایحه و برخی موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های شهرداری در اموری که مسئولیتی در

بررسی قوی ترین قانون حمایت از کودکان چه شد؟

مهر: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان توضیح داد و گفت: این لایحه قوی‌ترین قانون حمایت از کودک در جهان است. محمدعلی اسفغانی، با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوان برای بررسی نهایی روی میز کمیسیون قضائی قرار گرفته است، گفت: این لایحه ابتدا در کمیته حقوقی بررسی شد و واقعا کار سنگینی روی آن انجام شد. وی افزود: این لایحه یک طرح نو است که اگر تصویب شود می‌توان گفت که جامع‌ترین و کامل‌ترین قانون مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان جهان خواهد بود. قبلا این قانون ۹ماده‌ای بود، اما با قانون جدید که حدود ۷۰ ماده است تمام زوایای حقوقی حمایت از کودک و نوجوان

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص شیر و نخوردن گوشت خوب‌پخته‌نشده این حیوان است. این بیماری همچنین می‌تواند از طریق فرد مبتلا در بعضی موارد باعث انتقال به دیگران به‌خصوص اطرافیان نزدیک و کادر درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را دارند، شود. این موارد به‌خصوص هنگامی رخ می‌دهد که هنوز ابتلا به بیماری قطعی نشده و کادر درمانی نکات حفاظت از خود را رعایت نکرده باشند.

پیشگیری از انتقال بیماری کرونا، شستن مداوم دست‌ها و نیز خودداری از روبوسی و دست‌دادن با فرد مبتلاست. این بیماری یک دوره کمون ۱۴ روزه دارد. این بیماری از راه تماس نزدیک با شتر انتقال می‌یابد و سپس از طریق مجاری تنفسی به دیگران سرایت می‌کند؛ بنابراین بهترین راه استفاده‌نکردن از لبنیات پاستوریزه‌نشده شتر به‌خصوص